Глава 7. Элементы динамики космического полета. Спутниковые навигационные системы

7.1 Скорость спутника

Непритягивающий спутник. $m \ll M$; $\mu \simeq m$.



П – перицентр
А – апоцентр

линия апсид (прямая АП)

φ – истинная аномалия

$$r = \frac{p}{1+\varepsilon\cos\varphi}$$

$$\begin{cases} v_r = \dot r \,; \\ v_\varphi = r\dot\varphi \,; \end{cases} \qquad v_r = \frac{dr}{dt} = \frac{p\cdot\varepsilon\sin\varphi}{(1+\varepsilon\cos\varphi)^2}\cdot\frac{d\varphi}{dt} \qquad r = \frac{p}{1+\varepsilon\cos\varphi}$$

$$(\alpha = \gamma m M)$$

Момент импульса $L = m r^2\dot\varphi = m r^2\frac{d\varphi}{dt}$; $\frac{d\varphi}{dt} = \frac{L}{m r^2}$

$$\Rightarrow\ v_r = \frac{\cancel{p}\varepsilon\sin\varphi}{\cancel{(1+\varepsilon\cos\varphi)^2}}\,\frac{L}{m}\,\frac{\cancel{(1+\varepsilon\cos\varphi)^2}}{p^{\cancel{2}}} = \underline{\frac{L\varepsilon}{mp}\sin\varphi}$$

Параметр $p = \frac{L^2}{\alpha m} = \frac{L^2}{\alpha m}$; $\frac{L}{mp} = \frac{\sqrt{p\alpha m}}{mp} = \sqrt{\frac{\cancel{p}\cdot\gamma m M\cdot\cancel{m}}{\cancel{m^2}p^{\cancel{2}}}} = \sqrt{\frac{\gamma M}{p}}$

$$v_\varphi = \cancel{r}\cdot\frac{L}{m r^{\cancel{2}}} = \frac{L}{m}\,\frac{1+\varepsilon\cos\varphi}{p} = \underline{\frac{L}{mp}(1+\varepsilon\cos\varphi)}$$

$\varepsilon^2\sin^2\varphi + 1 + 2\varepsilon\cos\varphi + \varepsilon^2\cos^2\varphi$

$$\boxed{\begin{cases} v_r = \sqrt{\frac{\gamma M}{p}}\,\varepsilon\sin\varphi \\ v_\varphi = \sqrt{\frac{\gamma M}{p}}(1+\varepsilon\cos\varphi) \end{cases}}$$

$$\underline{v = \sqrt{v_r^2+v_\varphi^2} = \sqrt{\frac{\gamma M}{p}\left(1+\varepsilon^2+2\varepsilon\cos\varphi\right)}}$$

При $\varphi = 0$ (в перицентре) $\vec{v} \perp \vec{r}$ $(v_r = 0)$ $\quad v_\pi = v_{max} = \sqrt{\frac{\gamma M}{p}}(1+\varepsilon)$

При $\varphi = \pi$ (в апоцентре) $\quad v_\alpha = v_{min} = \sqrt{\frac{\gamma M}{p}}(1-\varepsilon)$

$r_\pi = \frac{p}{1+\varepsilon}$; $\quad r_\alpha = \frac{p}{1-\varepsilon}$ $\Rightarrow$ $v_\pi = \sqrt{\frac{\gamma M}{p}} \frac{p}{r_\pi}$

$v_\alpha = \sqrt{\frac{\gamma M}{p}} \frac{p}{r_\alpha}$

$\frac{v_\pi}{v_\alpha} = \frac{r_\alpha}{r_\pi}$ | Правило рычага

7.2 Характерные скорости

$$r = \frac{p}{1+\varepsilon\cos\varphi}$$

Чтобы тело удалилось на бесконечность, необходима параболическая траектория

$$\varepsilon = 1; \qquad v_{пар} = \sqrt{\frac{\gamma M}{p}\left(1+1^2+2\cos\varphi\right)} = \sqrt{\frac{\gamma M}{p}2\left(1+\cos\varphi\right)} = \sqrt{\frac{2\gamma M}{r}}$$

$$\boxed{v_{пар} = \sqrt{\frac{2\gamma M}{r}}}$$

Круговое движение:

$$\varepsilon = 0; \quad p = r = r_0; \quad v = \sqrt{\frac{\gamma M}{p}(1+0)} \Rightarrow$$

$$v_{кр} = \sqrt{\frac{\gamma M}{r_0}}$$



$$\frac{\cancel{m} v^2}{\cancel{r}} = \gamma \frac{\cancel{m} M}{r \cancel{r}}$$

$$\underline{v_{пар} = \sqrt{2}\, v_{кр}}$$

1я космическая скорость — круговая скорость у поверхности планеты

2я космическая скорость — параболическая скорость у пов. планеты

Земля:

$$v_I = \sqrt{\frac{\gamma M}{R}} = \sqrt{gR} = \sqrt{9{,}8 \cdot 6370\,км} = 7{,}9\ \frac{км}{с}$$

$$mg = \gamma \frac{mM}{R^2}$$

$$g = \frac{\gamma M}{R^2}$$

$$v_{II} = \sqrt{2}\, v_I = 1{,}41 \cdot 7{,}9 = \underline{11{,}2\ км/с}$$

Нулевой спутник — т.к. движется в непоср. близости от пов-сти

$$T_0 = \frac{2\pi R}{v_I} = \frac{40000}{7{,}9} = 5060\,с \simeq \underline{84{,}3\ мин}$$

7.3 Продолжительность перелета



t_0 – время прохожд. перицентра П

t – время достижения точки P

$\tau = t - t_0$ – продолжительность перелета

Ур-е: $\quad r = \dfrac{p}{1+\varepsilon\cos\varphi} \qquad L = m r^2 \dot\varphi = m r^2 \dfrac{d\varphi}{dt}$

$$\Rightarrow \quad dt = \frac{m r^2}{L} d\varphi = \frac{m p^2}{L} \frac{d\varphi}{(1+\varepsilon\cos\varphi)^2}$$

$$\frac{m p^2}{L} = \frac{m p^2}{\sqrt{m\alpha p}} = p^{3/2} \sqrt{\frac{\cancel{m^2}}{\cancel{m}\cdot \gamma \cancel{m} M}} = \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\gamma M}}$$

$$\boxed{\tau = \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\gamma M}} \int_0^{\varphi} \frac{d\varphi'}{(1+\varepsilon\cos\varphi')^2}}$$

продолжительность перелета

Интеграл зависит от ε:

1) $\varepsilon < 1$; 2) $\varepsilon = 1$

3) $\varepsilon > 1$;

$\underline{\varepsilon = 1}$

$$\tau = \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\gamma M}} \int_0^{\varphi} \frac{d\varphi'}{(1+\cos\varphi')^2} = \Big/ \quad x = tg\,\frac{\varphi}{2}$$

$$dx = \frac{1}{\cos^2\varphi/2}\,\frac{1}{2}\,d\varphi \;;$$

$$\cos\varphi = \cos 2\frac{\varphi}{2} = \cos^2\frac{\varphi}{2} - \sin^2\frac{\varphi}{2}$$

$$1+\cos\varphi = 1 + \cos^2\frac{\varphi}{2} - \sin^2\frac{\varphi}{2} = 2\cos^2\frac{\varphi}{2}$$

$$tg^2\frac{\varphi}{2} = \frac{\sin^2\varphi/2}{\cos^2\varphi/2} = \frac{1-\cos^2\varphi/2}{\cos^2\varphi/2} = \frac{1}{\cos^2\varphi/2} - 1$$

$$\Rightarrow \quad \cos^2\frac{\varphi}{2} = \frac{1}{1+tg^2\varphi/2} = \frac{1}{1+x^2} \quad \Big/ =$$

$$= \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\gamma M}} \int_0^{tg\,\varphi/2} \frac{2\cos^2\varphi/2 \cdot dx}{4\cos^4\varphi/2} = \frac{p^{3/2}}{2\sqrt{\gamma M}} \int_0^{tg\,\varphi/2} (1+x^2)\,dx =$$

$$= \frac{p^{3/2}}{2\sqrt{\gamma M}} \left(x + \frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^{tg\,\varphi/2}$$

$$\tau = \frac{p^{3/2}}{2\sqrt{\gamma M}}\left(\operatorname{tg}\varphi/2 + \frac{1}{3}\operatorname{tg}^3\frac{\varphi}{2}\right)$$

Время перелета по параболич. траектории

$\varepsilon \ll 1$ Эллиптич. орбита малого эксцентриситета

$$\frac{1}{(1+\underbrace{\varepsilon\cos\varphi}_{x})^2}$$

$$\frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2\frac{1}{(1+0)^3}\cdot x + O(x^2) = 1 - 2x + O(x^2)$$

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

$$\frac{1}{(1+\varepsilon\cos\varphi)^2} \simeq 1 - 2\varepsilon\cos\varphi$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\tau = \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\gamma M}} \int\limits_0^{\varphi} (1 - 2\varepsilon\cos\varphi')\,d\varphi' = \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\gamma M}}\left(\varphi - 2\varepsilon\sin\varphi\right)$$

При $\varphi = 2\pi$



$\tau = T$ – период

$$T = \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\gamma M}}\, 2\pi$$

$$\boxed{\tau = \frac{T}{2\pi}\left(\varphi - 2\varepsilon\sin\varphi\right)}$$

7.4 Элементы орбиты

Дек СК (xyz) ; xOy – экваториальная (для планет)



Линия узлов – прямая l пересечения плоскости орбиты и xOy

Точки пересеч-я l и орбиты – узлы

При переходе через узел в обл. $z>0$

$\Rightarrow$ восходящий узел Ω

Если попадаем в обл $z<0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ нисходящий узел $\mho$

Угол м/у Ox и l – Долгота восходящего узла Ω

$$0 \le \Omega \le 2\pi .$$

$\vec{\nu}$ – орт внешней нормали $\vec{\nu} \perp$ плоскости орбиты, и напр по пр-лу пр. винта

Угол γ между $\vec{D}$ и Oz — наклонение орбиты

γ и Ω опр. положение плоскости орбиты



Угол ω м/у линией апсид $O\Pi$ и линией узлов $O\Omega$ —

— аргумент перицентра

$0 \leq \omega < 2\pi$.

t_0 — время прохождения перицентра

Набор $\Omega, \gamma, \varepsilon, p, \omega, t_0$ позволяет определить положение спутника в $\forall t$
Элементы орбиты

7.5 Принцип спутниковой навигации



Пусть i-й спутник в момент t_i испускает сигнал, находясь в точке $\vec r_i$

До точки приема $\vec r$ сигнал пройдет путь l_i

$$l_i = c(t-t_i) = |\vec r - \vec r_i| = \sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2+(z-z_i)^2}$$

Неизвестные (t, x, y, z) — 4 перем.

$\Rightarrow$ В общ. случае нужно минимум 4 спутника.

ГЛОНАСС



Всего 24 спутника.

3 орб. плоскости разнесены на 120° по долготе восх. узла

x 8 спутников со сдвигом 45°

В соседних плоскостях позиции смещены на 15°.

Орбиты почти круговые с ном. высотой 19100 км

($18840 \div 19440$ км)

наклонение $64{,}8 \pm 0{,}3^\circ$.

∀ точке Земли видно min 4 спутника,

Все работает при $7 \times 3 = 21$ спутника — остальные в резерве.

Выведение:

1) НОО — Низкая опорная орбита

200 × 200 км — высота над поверхностью

(перицентр × апоцентр)

2) Изменение наклонения

3) переход на 200 × 19100

4) переход на 19100 × 19100

Гоман Hohmann

гомановский перелет.