

Математический анализ  
Раздел: Дифференциальное исчисление

Тема: *Дифференциал функции.  
Производные и дифференциалы порядка  $n$*

Лектор Янущик О.В.

2015 г.

## §6. Дифференциал функции

### 1. Определение и геометрический смысл

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Функция  $y = f(x)$  называется **дифференцируемой в точке  $x_0$** , если ее приращение в этой точке может быть записано как сумма линейной относительно  $\Delta x$  части и бесконечно малой более высокого порядка чем  $\Delta x$ , т.е.

$$\Delta f(x_0) = A \cdot \Delta x + \beta(\Delta x), \quad (1)$$

где  $A$  – число,  $\beta(\Delta x)$  – б.м. более высокого порядка чем  $\Delta x$ .

Слагаемое  $A \cdot \Delta x$  в выражении (1) (т.е. линейную относительно  $\Delta x$  часть  $\Delta f(x_0)$ ) называют **дифференциалом функции  $y = f(x)$  в точке  $x_0$**  и обозначают:  $dy(x_0)$ ,  $df(x_0)$ .

ТЕОРЕМА 1 (о связи дифференцируемости с существованием производной).

Функция  $y = f(x)$  дифференцируема в точке  $x_0 \Leftrightarrow$  она имеет в точке  $x_0$  производную. При этом для ее дифференциала в точке  $x_0$  справедливо равенство

$$dy(x_0) = f'(x_0) \cdot \Delta x . \quad (2)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Очевидно, что соответствие  $(x_0; \Delta x) \rightarrow df(x_0)$  является функцией (двух переменных).

Ее называют **дифференциалом функции**  $y = f(x)$  и обозначают

$$dy, df(x) .$$

**Замечание.** Из теоремы 1 следует, что нахождение производной и дифференциала функции представляет собой по существу одну и ту же задачу. Поэтому операцию нахождения производной называют **дифференцированием функции**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Функция  $y = f(x)$  называется **дифференцируемой на интервале  $(a;b)$**  если она дифференцируема (т.е. имеет производную) в каждой точке этого интервала.

Функция  $y = f(x)$  называется **дифференцируемой на отрезке  $[a;b]$**  если она дифференцируема на интервале  $(a;b)$  и имеет соответствующие односторонние производные в точках  $a$  и  $b$ .


# ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Рассмотрим график функции  $y = f(x)$ .

Пусть функция  $y = f(x)$  дифференцируема в точке  $x_0$ .

Тогда в  $x_0$  функция  $f(x)$  имеет производную  $f'(x_0)$ .

$\Rightarrow$  в точке  $M_0(x_0; f(x_0)) \exists$  касательная к кривой  $y = f(x)$ .



Справедливо утверждение: *дифференциал функции  $y = f(x)$  в точке  $x_0$  равен приращению ординаты точки на касательной к кривой  $y = f(x)$ , которое соответствует приращению  $\Delta x$ .*

## ПРИМЕРЫ.

Найти дифференциалы функций: 1)  $y = x^3$  ; 2)  $y = x$  .

### *Замечания.*

1) Так как для дифференциала функции  $y = x$  справедливо

$$dy = dx = \Delta x ,$$

то говорят: «дифференциал независимой переменной равен ее приращению».

Учитывая этот факт, формулу (2) можно переписать в виде

$$dy = f'(x) \cdot dx . \quad (3)$$

2) Из формулы (3) получаем, что производная  $y' = f'(x)$  является отношением 2-х дифференциалов:

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} .$$

Таким образом, символическая дробь  $\frac{dy}{dx}$  превратилась в реальную дробь.

## 2. Свойства дифференциалов

Из теоремы 1 и правил дифференцирования получаем, что справедливы следующие утверждения

1) Дифференциал константы равна нулю, т.е.

$$d(C) = 0, \text{ где } C - \text{константа.}$$

2) Дифференциал суммы (разности) равна сумме (разности) дифференциалов, т.е.  $d(u \pm v) = du \pm dv$ .

3) Дифференциал произведения находится по правилу:

$$d(u \cdot v) = du \cdot v + u \cdot dv.$$

4)  $d(C \cdot u) = C \cdot du$ , где  $C$  – константа.

Говорят: «константа выносится за знак дифференциала».

5) Дифференциал дроби находится по правилу:

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{du \cdot v - u \cdot dv}{v^2}, \quad (v(x) \neq 0).$$

Рассмотрим дифференциал сложной функции  $y = f(\varphi(t))$ .

Пусть функция  $x = \varphi(t)$  дифференцируема в точке  $t$ ,  
функция  $y = f(x)$  дифференцируема в точке  $x = \varphi(t)$ .

Тогда  $\exists$  производные  $x'(t)$  и  $f'(x)$  и сложная функция  $y = f(\varphi(t))$  имеет производную в точке  $t$ , причем

$$y'(t) = [f(\varphi(t))]' = f'(x) \cdot x'(t)$$

Следовательно, функция  $y = f(\varphi(t))$  дифференцируема в точке  $t$  и ее дифференциал в этой точке равен

$$dy(t) = y'(t) \cdot dt,$$

$$\Rightarrow dy(t) = f'(x) \cdot x'(t)dt,$$

$$\Rightarrow dy(t) = f'(x) \cdot \underbrace{x'(t)dt}_{dx},$$

$$\Rightarrow dy = f'(x) \cdot dx. \quad (4)$$

Сравним формулы (3) и (4):

(3):  $dy = f'(x) \cdot dx$ , где  $x$  – независимая переменная;

(4):  $dy = f'(x) \cdot dx$ , где  $x = \varphi(t)$  – функция.

Таким образом, формула (3) справедлива вне зависимости от того, является ли  $x$  независимым аргументом или функцией.

Поэтому формулу (3) называют **инвариантной формой записи дифференциала**.

**Замечание.** Формула

$$dy = f'(x) \cdot \Delta x \quad (2)$$

не является инвариантной.

Действительно, для сложной функции  $y = f(\varphi(t))$  имеем:

$$dy(t) = y'(t) \cdot \Delta t = f'(x) \cdot x'(t) \cdot \Delta t.$$

Но  $x'(t) \cdot \Delta t \neq \Delta x$ , т.к.

$$\Delta x = dx + \beta(\Delta t) = x'(t) \cdot \Delta t + \beta(\Delta t).$$

# §7. Производные и дифференциалы высших порядков

## 1. Производные высших порядков

Пусть  $y = f(x)$  дифференцируема на множестве  $X_1 \subseteq D(f)$ . Тогда на  $X_1$  определена  $f'(x)$ .

Функцию  $f'(x)$  называют также **первой производной функции  $f(x)$**  (или **производной первого порядка функции  $f(x)$** ).

Если  $f'(x)$  дифференцируема на некотором множестве  $X_2 \subseteq X_1$ , то  $(f'(x))'$  называют **второй производной функции  $y = f(x)$**  (или **производной второго порядка функции  $f(x)$** ) и обозначают

$$y'', \quad \frac{d^2 y}{dx^2}, \quad f''(x), \quad \frac{d^2 f}{dx^2}.$$

**Замечание.** Значение второй производной функции  $f(x)$  в точке  $x_0$  обозначают

$$y''(x_0), \quad \frac{d^2 y(x_0)}{dx^2}, \quad f''(x_0), \quad \frac{d^2 f(x_0)}{dx^2}.$$

Если  $f''(x)$  тоже дифференцируема на некотором множестве  $X_3 \subseteq X_2$ , то ее производную  $(f''(x))'$  называют **третьей производной функции  $y = f(x)$**  (или **производной третьего порядка функции  $f(x)$** ).

Продолжая этот процесс, назовем  **$n$ -й производной функции  $y = f(x)$**  ее производную от производной порядка  $n - 1$ .

Обозначают:

$y'''$ ,  $\frac{d^3 y}{dx^3}$ ,  $f'''(x)$ ,  $\frac{d^3 f}{dx^3}$  – третья производная  $y = f(x)$ ;

$y^{(4)}$ ,  $\frac{d^4 y}{dx^4}$ ,  $f^{(4)}(x)$ ,  $\frac{d^4 f}{dx^4}$  – четвертая производная  $y = f(x)$ ;

$y^{(n)}$ ,  $\frac{d^n y}{dx^n}$ ,  $f^{(n)}(x)$ ,  $\frac{d^n f}{dx^n}$  –  $n$ -я производная  $y = f(x)$ .

Производные порядка  $n > 1$  называют ***производными высших порядков***.

ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ второй производной.

Если  $S = S(t)$  – расстояние, пройденное точкой за время  $t$ ,  
то  $S'(t_0)$  – *скорость в момент времени  $t_0$* ,  
 $S''(t_0)$  – *ускорение в момент времени  $t_0$*  (скорость изменения скорости)

Справедливы следующие утверждения.

1)  $(C \cdot u)^{(n)} = C \cdot u^{(n)}$ , где  $C$  – константа.

Говорят: «константа выносится за знак  $n$ -й производной».

2) Производная  $n$ -го порядка суммы (разности) функций равна сумме (разности)  $n$ -х производных слагаемых, т.е.

$$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)} .$$

3)  $n$ -я производная произведения находится по формуле:

$$(u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot u^{(n-k)} \cdot v^{(k)}, \quad (1)$$

где  $u^{(0)} = u$ ,  $v^{(0)} = v$ .

Формула (1) называется **формулой Лейбница**.

## 2. Дифференциалы высших порядков

Пусть  $y = f(x)$  дифференцируема на множестве  $X_1 \subseteq D(f)$ .

Дифференциал  $dy = f'(x) \cdot dx$  – функция двух переменных  $x$  и  $dx = \Delta x$ .

Зафиксируем значение  $dx$ .

Тогда  $dy$  станет функцией одной переменной  $x$ .

Дифференциал функции  $dy(x)$  (если он существует) называется **дифференциалом второго порядка функции  $y = f(x)$**  (или **вторым дифференциалом функции  $y = f(x)$** ) и обозначается  $d^2y$ ,  $d^2f(x)$ .

$d^2y$  – функция переменной  $x$ .

Дифференциал функции  $d^2y$  (если он существует) называют **дифференциалом третьего порядка функции  $y = f(x)$**  (или **третьим дифференциалом функции  $y = f(x)$** ) и обозначается  $d^3y$ ,  $d^3f(x)$ .

Продолжая далее этот процесс, определим **дифференциал  $n$ -го порядка функции  $y = f(x)$**  как дифференциал от дифференциала порядка  $n - 1$ . Обозначают:  $d^n y$ ,  $d^n f(x)$ .

**Замечание.** Значение дифференциала  $n$ -го порядка функции  $f(x)$  в точке  $x_0$  обозначают  $d^n y(x_0)$ ,  $d^n f(x_0)$ .

Дифференциалы порядка  $n > 1$  называют **дифференциалами высших порядков**.

Если функция имеет дифференциал порядка  $n$ , то ее называют  **$n$  раз дифференцируемой**.

**ТЕОРЕМА 1** (о связи дифференциала  $n$ -го порядка и  $n$ -й производной).

*Функция  $y = f(x)$   $n$  раз дифференцируема в точке  $x_0 \Leftrightarrow$  она имеет в точке  $x_0$  производную порядка  $n$ . При этом для  $d^n y(x_0)$  справедливо равенство*

$$d^n y(x_0) = f^{(n)}(x_0) \cdot (dx)^n . \quad (2)$$

### *Замечания.*

- 1) Скобки в правой части формулы (2) обычно опускают, т.е. записывают ее в виде:

$$d^n y(x_0) = f^{(n)}(x_0) \cdot dx^n . \quad (3)$$

- 2) Из формулы (3) получаем, что  $n$ -я производная  $y^{(n)} = f^{(n)}(x)$  является отношением 2-х дифференциалов:

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n} .$$

Таким образом, символическая дробь  $\frac{d^{(n)} y}{dx^n}$  превратилась в реальную дробь.

- 3) Дифференциалы порядка  $n$  ( $n > 1$ ) не обладают свойством инвариантности. Т.е. формула (3) не будет верной, если  $x$  — функция.